Agastache cana 'Heather Queen'

Gewöhnlicher Name	Duftnessel 'Heather Queen'
Blütenfarbe	Pink bis purpur
Blühzeitpunkt	Juni-September
Wuchshöhe	40-70 cm
Wuchseigenschaften	Duftend, buschig
Standortanforderungen	Sonne, trocken, gut drainiert
Insektenfreundlichkeit	Exzellente Bienenpflanze

Agastache hybrida 'Astello Indigo'

Gewöhnlicher Name	Duftnessel 'Astello Indigo'
Blütenfarbe	Tiefviolett
Blühzeitpunkt	Juni-September
Wuchshöhe	40-60 cm
Wuchseigenschaften	Kompakt, reichblühend
Standortanforderungen	Sonne, durchlässig, mäßig trocken
Insektenfreundlichkeit	Stark besucht von Wildbienen




Anchusa azurea

Gewöhnlicher Name	Blaue Ochsenzunge, Anchusa
Blütenfarbe	Intensives Blau bis Azur (auch Varianten mit weiß/pink)
Blühzeitpunkt	Frühsommer bis Spätsommer (Juni–September)
Wuchshöhe	60–120 cm
Wuchseigenschaften	Ausläuferbildende oder horstige Staude mit rauem Laub und zahlreichen aufrechten Blütenrispen
Standortanforderungen	Vollsonne, gut durchlässiger, humoser Boden; verträgt Trockenheit bis mäßige Feuchte
Insektenfreundlichkeit	Gut für Bienen und Wildbienen; Blüten locken viele Bestäuber an



Anemone hupehensis 'Ouvertüre'

Gewöhnlicher Name	Herbstanemone
Blütenfarbe	Rosa
Blühzeitpunkt	Spätsommer bis Herbst (August–Oktober)
Wuchshöhe	50–90 cm
Wuchseigenschaften	Horstig, mehrjährige Staude mit reich blühenden, schlanken Stängeln
Standortanforderungen	Halbschatten bis Sonne, humoser, mäßig feuchter, gut durchlässiger Boden; verträgt Schatten besser als viele Sommerstauden
Insektenfreundlichkeit	Bietet spätblühenden Insekten Nektar; relevant für Spätsommerbestäuber



Anemone Japonica-Hybride 'Whirlwind'

Gewöhnlicher Name	Japanische/Herbstanemone 'Whirlwind'
Blütenfarbe	Weiß
Blühzeitpunkt	Spätsommer bis Herbst
Wuchshöhe	50–100 cm
Wuchseigenschaften	Horstig, reichblühend, trockenheitsempfindlich bei starkem Sonnenstand
Standortanforderungen	Halbschatten bis leichter Sonne, humoser, humusreicher Boden mit guter Feuchte
Insektenfreundlichkeit	Gute Nektarquelle für Spätsommer-Bestäuber



Aquilegia vulgaris

Gewöhnlicher Name	Gemeine Akelei
Blütenfarbe	Variabel – meist violett/blau, rosa, weiß
Blühzeitpunkt	Spätfrühling bis Frühsommer (Mai–Juni)
Wuchshöhe	40–80 cm
Wuchseigenschaften	Mehrjährig, bildet Horste; selbstablegende Samen führen zu Nachwuchs im Beet
Standortanforderungen	Halbschatten bis Sonne, verträgt auch Schatten, humoser, gut durchlässiger Boden
Insektenfreundlichkeit	Sehr bienenfreundlich, gut für Hummeln



Aster lateriflorus var. horizontalis 'Prince'

Gewöhnlicher Name	Seitenaster 'Prince'
Blütenfarbe	Rosa-weiß
Blühzeitpunkt	August–Oktober
Wuchshöhe	30–60 cm (flächig breiter Wuchs)
Wuchseigenschaften	Flach ausbreitender, bodendeckender Wuchs mit zahllosen kleinen Blüten; gut im Vordergrund
Standortanforderungen	Sonne bis Halbschatten, humoser, mäßig feuchter Boden
Insektenfreundlichkeit	Späte Blütephase wichtig für Herbstbestäuber; zieht Bienen und Schmetterlinge an



Aster novae-angliae 'Andenken an Paul Gerber'

Gewöhnlicher Name	Raublattaster, New-England-Aster
Blütenfarbe	Meist violett bis purpur
Blühzeitpunkt	August-Oktober
Wuchshöhe	80–150 cm
Wuchseigenschaften	Aufrecht, buschig, spätblühend; bildet dichte Horste
Standortanforderungen	Sonnig bis Halbschatten, humoser, feuchter bis mäßig nasser Boden; nährstoffreich
Insektenfreundlichkeit	Sehr wertvoll im Spätsommer/Herbst für Bienen, Schmetterlinge und andere Bestäuber



Aster novi-belgii

Gewöhnlicher Name	Glattblatt-Aster
Blütenfarbe	Tiefes Blau-Violett
Blühzeitpunkt	August-Oktober
Wuchshöhe	80–140 cm
Wuchseigenschaften	Ähnlich anderen N.-Aster-Sorten: aufrechte, buschige Pflanzen mit spätblühenden Rispen
Standortanforderungen	Sonne bis Halbschatten, feuchte, nährstoffreiche Böden bevorzugt
Insektenfreundlichkeit	Wertvoll für spätblühende Bestäuber; große Insektenanziehungskraft



Bistorta amplexicaulis 'Firetail'

Gewöhnlicher Name	Knotiger Knöterich, 'Firetail'
Blütenfarbe	Leuchtend Rosa/Rot
Blühzeitpunkt	Juli–September
Wuchshöhe	40–80 cm
Wuchseigenschaften	Horstig, ausdauernd, lange Blühdauer mit aufrechten Blütenähren
Standortanforderungen	Sonne bis Halbschatten, feuchter bis mäßig feuchter, humoser Boden; verträgt auch nasse Standorte
Insektenfreundlichkeit	Starke Nektarquelle, zieht Bienen und Schmetterlinge an



Calamintha nepeta

Gewöhnlicher Name	Bergminze
Blütenfarbe	Zartrosa bis helllila
Blühzeitpunkt	Juli-September
Wuchshöhe	30-50 cm
Wuchseigenschaften	Aromatisch, buschig, reich blühend
Standortanforderungen	Sonne, trocken bis frisch
Insektenfreundlichkeit	Eine der besten Insektenpflanzen im Spätsommer

Centaurea jacea

Gewöhnlicher Name	Wiesen-Flockenblume
Blütenfarbe	Violett
Blühzeitpunkt	Juni-September
Wuchshöhe	40-80 cm
Wuchseigenschaften	Mehrjährig, horstig
Standortanforderungen	Sonne bis Halbschatten, mäßig feuchte Böden
Insektenfreundlichkeit	Hervorragend für Wildbienen



Centranthus ruber alba 'Snow Cloud'

Gewöhnlicher Name	Weiße Spornblume
Blütenfarbe	Weiß
Blühzeitpunkt	Mai-September
Wuchshöhe	40–70 cm
Wuchseigenschaften	Mehrjährige, buschig, reichblühend
Standortanforderungen	Sonne, trocken bis frisch, kalkliebend
Insektenfreundlichkeit	Gut besucht von Schmetterlingen und Bienen

Cephalaria gigantea

Gewöhnlicher Name	Riesen-Skabiose
Blütenfarbe	Hellgelb
Blühzeitpunkt	Juni-August
Wuchshöhe	150-250 cm
Wuchseigenschaften	Sehr hoch, majestätisch, horstig
Standortanforderungen	Sonne, frische, nährstoffreiche Böden
Insektenfreundlichkeit	Sehr gut, besonders für große Wildbienen



Dianthus carthusianorum

Gewöhnlicher Name	Karthäusernelke
Blütenfarbe	Magenta
Blühzeitpunkt	Juni-September
Wuchshöhe	20-50 cm
Wuchseigenschaften	Schlank, horstig
Standortanforderungen	Sonne, trockene Standorte
Insektenfreundlichkeit	Sehr gut für Tagfalter



Digitalis lutea

Gewöhnlicher Name	Gelber Fingerhut
Blütenfarbe	Hellgelb
Blühzeitpunkt	Juni-Juli
Wuchshöhe	40-80 cm
Wuchseigenschaften	Schlank, horstig
Standortanforderungen	Halbschatten, kalkhaltige Böden
Insektenfreundlichkeit	Gut



Digitalis purpurea

Gewöhnlicher Name	Roter Fingerhut
Blütenfarbe	Pink-purpur
Blühzeitpunkt	Juni-August
Wuchshöhe	80-180 cm
Wuchseigenschaften	Zweijährig, hoch, imposant
Standortanforderungen	Halbschatten, frische Böden
Insektenfreundlichkeit	Sehr gut, v. a. für Hummeln



Echinacea pallida

Gewöhnlicher Name	Blassblättriger Sonnenhut
Blütenfarbe	Rosa
Blühzeitpunkt	Juni-August
Wuchshöhe	60–100 cm
Wuchseigenschaften	Schlank, elegante Blüten
Standortanforderungen	Sonne, trockene Böden
Insektenfreundlichkeit	Sehr gut



Echinops ritro

Gewöhnlicher Name	Kugeldistel
Blütenfarbe	Blau
Blühzeitpunkt	Juli-September
Wuchshöhe	50-100 cm
Wuchseigenschaften	Horstig, kugelige Blütenstände
Standortanforderungen	Vollsonnig, trocken bis frisch, durchlässig
Insektenfreundlichkeit	Sehr gute Bienen- und Hummel-Pflanze



Echium plantagineum

Gewöhnlicher Name	Wegerichblättriger Natternkopf
Blütenfarbe	Blau (je nach Form auch andere Farbtöne möglich)
Blühzeitpunkt	Frühjahr bis Frühsommer
Wuchshöhe	40–100 cm
Wuchseigenschaften	Aufrecht, meist mehrjährig bis zweijährig
Standortanforderungen	Sonne, trockene, durchlässige Böden
Insektenfreundlichkeit	Hoch, sehr attraktiv für Bienen



Echium vulgare

Gewöhnlicher Name	Gewöhnlicher Natternkopf
Blütenfarbe	Blau bis purpur
Blühzeitpunkt	Mai-September
Wuchshöhe	30–100 cm
Wuchseigenschaften	Zweijährig, rauhaarig, robust
Standortanforderungen	Sonne, trockene, magere Böden
Insektenfreundlichkeit	Exzellent für Wildbienen und Schmetterlinge






Euphorbia myrsinites

Gewöhnlicher Name	Myrten-Wolfsmilch
Blütenfarbe	Gelbgrün
Blühzeitpunkt	April-Mai
Wuchshöhe	15-30 cm
Wuchseigenschaften	Kriechend, sukkulent-ähnlich
Standortanforderungen	Sonne, sehr gut drainierte Böden
Insektenfreundlichkeit	Gut



Euphorbia palustris 'Walenburg's Glorie'

Gewöhnlicher Name	Sumpf-Wolfsmilch 'Walenburg's Glorie'
Blütenfarbe	Gelbgrün, schöne Herbstfärbung mit orange-rotem Laub
Blühzeitpunkt	April-Mai
Wuchshöhe	70–120 cm
Wuchseigenschaften	Horstig, robust
Standortanforderungen	Feuchte bis nasse Böden
Insektenfreundlichkeit	Gut



Foeniculum vulgare 'Bronze'

Gewöhnlicher Name	Bronze-Fenchel
Blütenfarbe	Gelb
Blühzeitpunkt	Juli-September
Wuchshöhe	120-180 cm
Wuchseigenschaften	Aromatisch, aufrecht
Standortanforderungen	Sonne, durchlässiger Boden
Insektenfreundlichkeit	Sehr gut



Fragaria vesca

Gewöhnlicher Name	Wald-Erdbeere
Blütenfarbe	Weiß
Blühzeitpunkt	Mai-Juni
Wuchshöhe	10-20 cm
Wuchseigenschaften	Mehrjährig, locker ausläuferbildend
Standortanforderungen	Halbschattig, frisch
Insektenfreundlichkeit	Blüten und Früchte wertvoll



Geum rivale

Gewöhnlicher Name	Bach-Nelkenwurz
Blütenfarbe	Rosa bis rotbraun
Blühzeitpunkt	Mai-Juni
Wuchshöhe	20-40 cm
Wuchshöheit	bildet Horste, feuchtigkeitsliebend
Standortanforderungen	Feuchte Böden, Halbschatten bis Sonne
Insektenfreundlichkeit	Gut



Helenium 'El Dorado'

Gewöhnlicher Name	Sonnenbraut 'El Dorado'
Blütenfarbe	Gelb bis orange
Blühzeitpunkt	Juli-September
Wuchshöhe	60-100 cm
Wuchshöheigenschaften	Horstig, reichblühend
Standortanforderungen	Sonne, feuchte bis mäßig frische Böden
Insektenfreundlichkeit	Sehr gut



Hesperis matronalis

Gewöhnlicher Name	Nachtviole
Blütenfarbe	Lila, rosa, weiß
Blühzeitpunkt	Mai-Juni
Wuchshöhe	40-90 cm
Wuchseigenschaften	Zweijährig bis kurzlebig mehrjährig
Standortanforderungen	Sonne bis Halbschatten
Insektenfreundlichkeit	Gut (duftend, anziehend für Nacht- und Tagbestäuber)



Hypericum perforatum

Gewöhnlicher Name	Echtes Johanniskraut
Blütenfarbe	Gelb
Blühzeitpunkt	Juni-August
Wuchshöhe	30-80 cm
Wuchseigenschaften	Heimisch, ausdauernd
Standortanforderungen	Sonne, trocken bis frisch
Insektenfreundlichkeit	Guter Pollenlieferant für Wildbienen



Knautia arvensis

Gewöhnlicher Name	Acker-Witwenblume
Blütenfarbe	Rot bis purpur
Blühzeitpunkt	Juni-September
Wuchshöhe	30-80 cm
Wuchshöheiten	Locker, mehrjährig
Standortanforderungen	Sonne, trockene bis frische Böden
Insektenfreundlichkeit	Sehr gut



Leonurus cardiaca

Gewöhnlicher Name	Herzgespann
Blütenfarbe	Rosa bis weiß (artenabhängig)
Blühzeitpunkt	Juni-September
Wuchshöhe	60-140 cm
Wuchshöheiten	Aufrecht, horstig
Standortanforderungen	Sonne bis Halbschatten, frische Böden
Insektenfreundlichkeit	Gut



Linaria purpurea

Gewöhnlicher Name	Purpur-Leinkraut
Blütenfarbe	Purpur bis rosa
Blühzeitpunkt	Juni-September
Wuchshöhe	40–100 cm
Wuchshöheiten	Locker, langblühend
Standortanforderungen	Sonne bis Halbschatten, gut drainierte Böden
Insektenfreundlichkeit	Sehr gut



Oenothera (Gaura) lindheimeri

Gewöhnlicher Name	Prachtkerze
Blütenfarbe	Weiß bis Rosa
Blühzeitpunkt	Juni-Oktober
Wuchshöhe	60-120 cm
Wuchseigenschaften	Locker, schwingend
Standortanforderungen	Sonne, trocken-durchlässig
Insektenfreundlichkeit	Gut



Onobrychis viciifolia

Gewöhnlicher Name	Saat-Esparsette
Blütenfarbe	Rosa
Blühzeitpunkt	Mai-Juni
Wuchshöhe	30-80 cm
Wuchseigenschaften	Mehrjährig, horstig
Standortanforderungen	Sonnig, trocken
Insektenfreundlichkeit	Exzellente Bienenweide



Penstemon digitalis

Gewöhnlicher Name	Fingerhut-Bartfaden
Blütenfarbe	Weiß
Blühzeitpunkt	Juni-August
Wuchshöhe	60–120 cm
Wuchseigenschaften	Aufrecht, horstig
Standortanforderungen	Sonne, frisch bis trocken
Insektenfreundlichkeit	Gut, besonders für Hummeln





Penstemon 'Twizzle Purple'

Gewöhnlicher Name	Bartfaden 'Twizzle Purple'
Blütenfarbe	Purpurviolett
Blühzeitpunkt	Juni-September
Wuchshöhe	70–90 cm
Wuchseigenschaften	Schlank, aufrecht
Standortanforderungen	Sonne, durchlässig
Insektenfreundlichkeit	Gut



Persicaria orientalis

Gewöhnlicher Name	Orient-Knöterich
Blütenfarbe	Purpurrosa
Blühzeitpunkt	Juli-September
Wuchshöhe	120-200 cm
Wuchseigenschaften	Einjährig, imposant
Standortanforderungen	Sonne, frisch bis feucht
Insektenfreundlichkeit	Gut





Peucedanum verticillare

Gewöhnlicher Name	Quirl-Kälberkropf
Blütenfarbe	weiß
Blühzeitpunkt	Juli-August
Wuchshöhe	180-250 cm
Wuchseigenschaften	Hoch, doldenblütig
Standortanforderungen	Sonne-Halbschatten, frisch
Insektenfreundlichkeit	Sehr gut für Schwebfliegen



Phlomis fruticosa

Gewöhnlicher Name	Jerusalem-Salbei
Blütenfarbe	Gelb
Blühzeitpunkt	Mai-Juli
Wuchshöhe	80-120 cm
Wuchseigenschaften	Immergrün, buschig
Standortanforderungen	Sonne, trocken
Insektenfreundlichkeit	Gut



Penstemon palmeri

Gewöhnlicher Name	Palmer-Bartfaden
Blütenfarbe	Zartrosa
Blühzeitpunkt	Mai–Juli
Wuchshöhe	60–150 cm
Wuchseigenschaften	Aufrecht, duftende Blüten, kurzlebige Staude
Standortanforderungen	Vollsonne, sehr trocken, nährstoffarm
Insektenfreundlichkeit	Beliebt bei großen Wildbienen

Ranunculus acris 'duplex'

Gewöhnlicher Name	Gefüllter Scharfer Hahnenfuß
Blütenfarbe	Gelb (gefüllt)
Blühzeitpunkt	Mai-Juli
Wuchshöhe	50-100 cm
Wuchseigenschaften	Horstig, langlebig
Standortanforderungen	Sonne bis Halbschatten, frisch bis feucht
Insektenfreundlichkeit	Gefüllte Blüten = geringe Insektenrelevanz



Salvia nemorosa

Gewöhnlicher Name	Steppensalbei
Blütenfarbe	Violettrosa
Blühzeitpunkt	Mai-September
Wuchshöhe	40-60 cm
Wuchseigenschaften	Horstig
Standortanforderungen	Sonne
Insektenfreundlichkeit	Sehr gut




Salvia pratensis

Gewöhnlicher Name	Wiesensalbei
Blütenfarbe	Blauviolett
Blühzeitpunkt	Mai-Juli
Wuchshöhe	30-70 cm
Wuchseigenschaften	Rosettenbildend
Standortanforderungen	Sonne, trocken
Insektenfreundlichkeit	Exzellent



Salvia sclarea 'alba'

Gewöhnlicher Name	Muskatellersalbei 'Alba'
Blütenfarbe	Weiß
Blühzeitpunkt	Juni-August
Wuchshöhe	80–120 cm
Wuchseigenschaften	Zweijährig, imposant
Standortanforderungen	Sonne, trocken
Insektenfreundlichkeit	Sehr gut für Hummeln



Salvia spathacea

Gewöhnlicher Name	Kolibri-Salbei / Duft-Salbei
Blütenfarbe	Magenta bis purpur
Blühzeitpunkt	März-Juni
Wuchshöhe	30-90 cm
Wuchseigenschaften	Ausläuferbildend, stark duftende Blätter
Standortanforderungen	Sonne bis Halbschatten, trocken bis mäßig feucht
Insektenfreundlichkeit	Hervorragende Nektarpflanze für Bienen


Salvia viridis

Gewöhnlicher Name	Schopfsalbei
Blütenfarbe	Violett/Rosa
Blühzeitpunkt	Mai-August
Wuchshöhe	30-50 cm
Wuchseigenschaften	Einjährig, locker aufrecht
Standortanforderungen	Sonnig, trocken bis frisch
Insektenfreundlichkeit	Sehr insektenfreundlich



Sanguisorba minor

Gewöhnlicher Name	Kleiner Wiesenknopf
Blütenfarbe	Rotbraun
Blühzeitpunkt	Juni-August
Wuchshöhe	20-50 cm
Wuchseigenschaften	Zierlich
Standortanforderungen	Sonne, trocken
Insektenfreundlichkeit	Gut



Sedum ‘Herbstfreude’

Gewöhnlicher Name	Fetthenne 'Herbstfreude'
Blütenfarbe	Rosa-Rot
Blühzeitpunkt	August-Oktober
Wuchshöhe	40-70 cm
Wuchseigenschaften	Sukkulent, horstig
Standortanforderungen	Sonne, trocken
Insektenfreundlichkeit	Exzellent



Silene coronaria

Gewöhnlicher Name	Kronen-Lichtnelke
Blütenfarbe	Magenta oder Weiß
Blühzeitpunkt	Juni-August
Wuchshöhe	50-80 cm
Wuchseigenschaften	Filziges Laub, zweijährig
Standortanforderungen	Sonne, mager
Insektenfreundlichkeit	Gut





Stachys byzantina

Gewöhnlicher Name	Wollziest
Blütenfarbe	Rosa
Blühzeitpunkt	Juni-August
Wuchshöhe	20-40 cm
Wuchseigenschaften	Filzig, bodendeckend
Standortanforderungen	Sonne, trocken
Insektenfreundlichkeit	Gut (v. a. Blattnutzung)



Verbascum bombyciferum

Gewöhnlicher Name	Schnee-Königskerze
Blütenfarbe	Gelb
Blühzeitpunkt	Juni-August
Wuchshöhe	150-200 cm
Wuchseigenschaften	Filzige Blattrosette, imposant
Standortanforderungen	Sonne, sehr trocken
Insektenfreundlichkeit	Gut



Verbena hastata ’Blue Spires’

Gewöhnlicher Name	Scheinrebe
Blütenfarbe	Dunkellila
Blühzeitpunkt	Juli-September
Wuchshöhe	100-150 cm
Wuchseigenschaften	Aufrecht
Standortanforderungen	Sonne, frisch
Insektenfreundlichkeit	Sehr gut



Viscaria vulgaris

Gewöhnlicher Name	Gewöhnliches Pechnelkenkraut
Blütenfarbe	Pink
Blühzeitpunkt	Mai-Juli
Wuchshöhe	30-60 cm
Wuchseigenschaften	Schlank, horstig, klebrige Stängel
Standortanforderungen	Sonnig, trocken, mager
Insektenfreundlichkeit	Sehr gute Nektarquelle für Schmetterlinge

